

1、体现“证”的内在本质的是

- A.病因
- B.病位
- C.病机
- D.病性

2、“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”所阐述的阴阳关系是

- A.互根互用
- B.对立制约
- C.交感互藏
- D.相互转化

3.患者久病，症见舌卷、舌强，语謇或失语，主要为哪项功能失常

- A.脾主肌肉
- B.心主血脉
- C.心主神志
- D.肝主藏血

4、脏腑关系中，被称为“燥湿相济”的是

- A.脾与胃
- B.肝与肾
- C.肺与肾
- D.脾与肾

5.治疗痰饮水肿常选用利水药与补气药相结合，其理论依据是

- A.津能载气
- B.气能行津
- C.气能摄津
- D.气能生津

6、按照十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是

- A.胆经
- B.胃经
- C.肾经
- D.肺经

7、七情致病，首先影响的是

- A.肝魂
- B.肾志
- C.心神
- D.脾意

8、疾病后期，遗留某些后遗症的病机是

- A.正盛邪退

B.邪去正虚

C.邪胜正衰

D.正虚邪恋

9、“益火之源，以消阴翳”属于

- A.阴病治阳
- B.阳病治阴
- C.阳中求阴
- D.阴中求阳

10、下列各项中，均属于面色白主病的是

- A.寒证、夺气
- B.气滞、血瘀
- C.疼痛、水饮
- D.湿证、虚证

11、白睛发红，多属于

- A.肝火
- B.心火
- C.脾热
- D.肺火

12、下列除哪项外，均可导致“金实不鸣”

- A.外感风寒
- B.风热袭肺
- C.痰湿蕴肺
- D.阴虚火旺

13、形瘦食少多属

- A.形盛气虚
- B.中气虚弱
- C.中焦火盛
- D.形气有余

14、实脉与洪脉脉象的共同特征是

- A.来盛去衰
- B.来去俱盛
- C.充实有力
- D.软弱无力

15、症见头晕眼花，神疲乏力，气短声低，腹部坠胀，大便溏泄，舌淡，脉虚。证属

- A.气逆证
- B.气虚证
- C.气陷证

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328

D.气不固证

16、症见久病咳喘，胸闷心悸，乏力少气、自汗声低，舌淡脉弱，其证候是

- A.心脾两虚
- B.心肺气虚
- C.肾不纳气
- D.肺脾气虚

17、下列可见于膀胱湿热证而不见于小肠实热证的临床表现是

- A.小腹胀痛，发热腰痛
- B.小便赤涩，尿道灼痛
- C.心烦口渴，口舌生疮
- D.舌红苔黄，脉数

18、症见无热恶寒，但欲寐，四肢厥冷、下利清谷者，宜诊断为

- A.少阴热化证
- B.少阴寒化证
- C.太阴病证
- D.少阳病证

19、生姜配黄芩属于药物七情中的

- A.相使
- B.相反
- C.相畏
- D.相恶

20、既可用于骨蒸劳热，又能利尿通淋的是

- A.地骨皮
- B.白薇
- C.胡黄连
- D.青蒿

21、药性甘、平，化痰利尿宜生用，止血宜炒炭用的是

- A.白茅根
- B.仙鹤草
- C.蒲黄
- D.茜草

22、牛黄入丸、散服，其用量是

- A.0.03~0.1g
- B.0.15~0.35g
- C.0.5~1.5g
- D.1.5~3.0g

23、香附、香橼的功效共同点是

- A.疏肝解郁，理气宽中
- B.疏肝解郁，调经止痛
- C.行气止痛，纳气平喘
- D.疏肝理气，燥湿化痰

24、药性甘平，授乳期妇女不宜使用的消食药是

- A.山楂
- B.稻芽
- C.麦芽
- D.莱菔子

25、具有滋补肝肾，凉血止血功效的药物是

- A.苎麻根
- B.侧柏叶
- C.女贞子
- D.墨旱莲

26、治疗惊痫抽搐，宜选用的药物是

- A.芦荟
- B.郁李仁
- C.芫花
- D.巴豆霜

27、既为喉科又为眼科常用药的是

- A.硼砂
- B.炉甘石
- C.蟾蜍
- D.板蓝根

28、原书服法要求“若急汗，热服，以童粥投之；若缓汗，温服，而不用汤投之”的方剂是

- A.九味羌活汤
- B.银翘散
- C.大青龙汤
- D.小青龙汤

29、黄龙汤与新加黄龙汤的组成中，均不含有的药物是

- A.人参、当归
- B.枳实、厚朴
- C.玄参、麦冬
- D.牛膝、升麻

30、《医宗金鉴》所说“以大寒之剂，易为清补之方”的方剂是

- A.白虎加人参汤

- B.生脉散
- C.竹叶石膏汤
- D.玉女煎

31、既可治疗胸痛，头痛，日久不愈，痛如针刺而有定处，又可治疗呃逆干呕，甚则水入即呛的方剂是

- A.桃核承气汤
- B.血府逐瘀汤
- C.复元活血汤
- D.隔下逐瘀汤

32、以理气化痰，清胆和胃为功用的方剂是

- A.蒿芩清胆汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.导痰汤
- D.温胆汤

33、配伍用药主以燥化，辅以行气，主以运脾，兼以和胃的方剂是

- A.厚朴温中汤
- B.平胃散
- C.藿香正气散
- D.三仁汤

34、防风通圣散证的病机是

- A.素体阳虚，外感风寒
- B.外感风邪，内有蕴热
- C.外感风寒，寒饮内停
- D.外感风寒，内伤生冷

35、紫雪的功用是

- A.芳香开窍，行气止痛
- B.清热解毒，开窍醒神
- C.清热开窍，息风止痉
- D.化浊开窍，清热解毒

36、患者症见右小腿处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细。治宜选用

- A.阳和汤
- B.四妙勇安汤
- C.五味消毒饮
- D.牛蒡解肌汤

37、患者女性，67岁。平素体弱易感冒。3天前受凉后出现恶寒发热。刻下症见：恶寒重，发热轻，头身疼痛，无汗，面色白，四肢不温，舌质淡胖，苔白，脉沉细无力。其治法是

- A.辛温解表
- B.助阳解表
- C.益气解表
- D.滋阴解表

38、患者男性，60岁。1周前无明显诱因出现腹部疼痛，时作时止，痛处喜温、喜按，饥饿、劳累后更甚，得食或休息后稍减，神疲乏力，气短懒言，舌淡苔白，脉象沉细。治宜选用

- A.良附丸合正气天香散
- B.大承气汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.小建中汤

39、患者女性，22岁。肺迁延2年不愈。症见咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白，偶有夹血，血色淡红、午后潮热，面色颧白，颧红，自汗盗汗，神疲倦怠，舌质光淡，边有齿痕，苔薄，脉细弱而数。其辨证是

- A.肺阴亏损证
- B.虚火灼肺证
- C.气阴耗伤证
- D.阴阳虚损证

40、患者男性，83岁。慢性支气管炎病史30余年。吸烟史50余年，每日15支。喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，汗出肢冷，面青唇紫，舌质淡，舌苔白，脉沉弱。治宜选用

- A.金匮肾气丸合参蛤散
- B.参附汤送服黑锡丹
- C.七味都气丸合平喘固本汤
- D.生脉散合补肺汤

41、患者女性，67岁。高血压病史10年，冠心病病史3年。近1月来心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴有腰酸耳鸣，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少，脉细数。治宜选用

- A.安神定志丸
- B.苓桂术甘汤
- C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
- D.天王补心丹合朱砂安神丸

42、患者，男，62岁。近一年来时感眩晕头痛，耳鸣，多梦，心烦易怒，苦咽干、颜面潮热，舌红苔黄，脉弦细数。宜首选的方剂是

- A.天麻钩藤饮
- B.半夏白术天麻汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.左归丸

43、患者男性，83岁。既往体健。近一年来记忆力减退，不能辨认熟人，说话时找词困难，

言语颠倒，多梦易惊，倦怠少动，面唇无华，纳呆食少，大便溏薄，舌质淡苔白，脉细弱。

治宜选用

- A.七福饮
- B.还少丹
- C.归脾汤
- D.洗心汤

44、患者女性，46岁。因长期饮食不规律3年前出现胃部疼痛，治疗后好转。昨日夜间接因饮用凉饮而胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，舌淡苔白、脉弦紧。其治法是

- A.温中健脾，和胃止痛
- B.温胃散寒，行气止痛
- C.养阴益胃，和中止痛
- D.温中补虚，缓急止痛

45、患者女性，51岁。三天前与同事吵架后出现呃逆连声，胸胁满闷，脘腹胀满，嗳气纳减，肠鸣矢气，苔薄白、脉弦。治宜选用

- A.竹叶石膏汤
- B.旋覆代赭汤
- C.柴胡疏肝散
- D.五磨饮子

46、患者男性，33岁。平素嗜食肥甘厚味，昨日与朋友聚餐饮酒。今晨出现右肋肋部绞痛难忍，伴往来寒热，身目发黄，恶心呕吐，口苦纳呆，便秘溲赤，苔黄腻，脉弦数。治疗宜首选的方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.柴胡疏肝散
- C.大柴胡汤
- D.小柴胡汤

47、患者男性，23岁。平素嗜食肥甘厚味。近一个月来频繁遗精，小便黄赤，热涩不畅，口苦而黏，舌质红苔黄腻，脉濡数。治宜首选

- A.妙香散
- B.龙胆泻肝汤
- C.黄连清心饮
- D.程氏萆薢分清饮

48、颤证的基本病机是

- A.外邪侵袭，经络闭阻
- B.经脉痹阻，腰府失养
- C.阴虚血少，筋脉失养
- D.肝风内动，筋脉失养

49、患者女性，37岁。素来体虚。近一周来胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温

畏冷，泛吐清水痰涎，头晕目眩，纳少便溏，舌苔白滑，脉弦细而滑。治宜选用

- A.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- B.苓桂术甘汤和金匮肾气丸
- C.甘遂半夏汤
- D.己椒藜黄丸

50、患者女性，63岁。发热后突然出现肢体软弱无力，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利，小便黄赤，大便干燥，舌质红，苔黄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.虎潜丸
- B.加味二妙散
- C.参苓白术散
- D.清燥救肺汤

51、患者男性，32岁。患者时感腰部冷痛重着，不能转侧，活动不利，天阴下雨则疼痛尤甚，舌淡，苔白腻脉沉迟。治宜选用

- A.肾着汤
- B.四妙丸加減
- C.蠲痹汤
- D.右归丸

52、听宫与听会所对应的经脉是

- A.肾经与督脉
- B.小肠经与胆经
- C.心经与三焦经
- D.肝经与膀胱经

53、下列不属于睛明穴主治病证的是

- A.呃逆
- B.目赤肿痛
- C.急性腰扭伤
- D.心悸怔忡

54、宜在肌肉丰厚部位施术的辅助手法是

- A.飞法
- B.弹法
- C.摇法
- D.震颤法

55、治疗目内眦、颈项、耳、肩部疾病常用后溪配

- A.足临泣
- B.申脉
- C.外关
- D.内关

56、（56~58 题共用题干）患者男性，76 岁。高脂血症病史 15 年。近三周来自觉心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰酸膝软，头晕耳鸣，口干便秘，舌红苔薄，脉促代。

其辨证为

- A.气阴两虚证
- B.心肾阴虚证
- C.心肾阳虚证
- D.气滞心胸证

57、（56~58 题共用题干）患者男性，76 岁。高脂血症病史 15 年。近三周来自觉心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰酸膝软，头晕耳鸣，口干便秘，舌红苔薄，脉促代。

其治法是

- A.滋阴清火，养心和络
- B.益气养阴，活血通脉
- C.疏肝理气，活血通络
- D.温补阳气，振奋心阳

58、（56~58 题共用题干）患者男性，76 岁。高脂血症病史 15 年。近三周来自觉心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰酸膝软，头晕耳鸣，口干便秘，舌红苔薄，脉促代。

治宜选用

- A.生脉散合人参养荣汤
- B.天王补心丹合炙甘草汤
- C.六味地黄丸合交泰丸
- D.参附汤合右归饮

59、（59~61 题共用题干）患者女性，79 岁。高血压病史 15 年。平素头晕头痛，耳鸣眩晕，腰酸腿软。昨日与家人争吵后，突然出现右侧肢体沉重麻木，口舌歪斜，言语不利，舌质红绛，脉细弦数。

其诊断是

- A.中风 风阳上扰证
- B.中风 阴虚风动证
- C.中风 痰热腑实证
- D.中风 痰浊瘀闭证

60、（59~61 题共用题干）患者女性.79 岁。高血压病史 15 年。平素头晕头痛、耳鸣眩晕，腰酸腿软。昨日与家人争吵后，突然出现半身不遂，右侧肢体沉重麻木，口舌歪斜，言语不利、舌质红绛，脉细弦数。

若患者病情进一步发展，出现突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，躁扰不宁，苔黄腻，脉弦滑而数。其治法是

- A.化痰息风，宣郁开窍
- B.滋养肝肾，潜阳息风
- C.息风清火，豁痰开窍
- D.清肝泻火，息风潜阳

61、（59~61 题共用题干）患者女性，79 岁。高血压病史 15 年。平素头晕头痛，耳鸣眩晕，

腰酸腿软。昨日与家人争吵后，突然出现右侧肢体沉重麻木、口舌歪斜，言语不利，舌质红绛，脉细弦数。

若患者病情发展迅速，出现突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，躁扰不宁、苔黄腻、脉弦滑而数。

若患者经过治疗，情况好转，神志渐清，但仍见右侧肢体偏枯不用，肢软无力、面色萎黄、舌质淡紫、苔薄白，脉细涩。治宜选用

- A.天麻钩藤饮
- B.镇肝息风汤
- C.地黄饮子
- D.补阳还五汤

IA 型题 62 /165

(62~64 题为共用题干) 患者男性、67 岁。泄泻反复发作 3 年余，大便时溏时泻，稍食油腻则泄泻增剧。纳谷不香、脘腹胀闷，面色少华，体倦乏力，舌淡苔白，脉细弱。

其治法是

- A.温肾健脾，涩肠止泻
- B.健脾益气，化湿止泻
- C.温中散寒，渗湿止泻
- D.升阳化湿，健脾止泻

IA 型题 63 /165

(62~64 题为共用题干) 患者男性、67 岁。泄泻反复发作 3 年余，大便时溏时泻，稍食油腻则泄泻增剧。纳谷不香、脘腹胀闷，面色少华、体倦乏力，舌淡苔白，脉细弱。

治宜选用

- A.参苓白术散
- B.益胃汤
- C.四神丸
- D.痛泻要方

IA 型题 64 /165

(62~64 题为共用题干) 患者男性、67 岁。泄泻反复发作 3 年余，大便时溏时泻，稍食油腻则泄泻增剧，纳谷不香、脘腹胀闷，面色少华，体倦乏力、舌淡苔白、脉细弱。

若患者症见肠鸣辘辘、大便溏黏，舌苔厚腻、宜加用的中药是

- A.吴茱萸、肉桂、附子
- B.黄连、厚朴、地锦草
- C.乌梅、五倍子、黄柏
- D.防风、羌活、苍术

A 型题 65 /165

65~67 题为共用题干) 患者男、67 岁。有前列腺肥大史 3 年。近两周出现小便不畅，尿如细线，小腹胀满疼痛，舌紫暗，脉涩。

其诊断是

- A.淋证之石淋
- B.癃闭之浊瘀阻塞证

- C.癃闭之膀胱湿热证
- D.癃闭之脾气不升证

IA 型题 66 /165

(65～67 题为共用题干) 患者男、67 岁。有前列腺肥大史 3 年，近两周出现小便不畅、尿如细线，小腹胀满疼痛，舌紫暗，脉涩。
其治法是

- A.行瘀散结，通利水道
- B. 疏利气机，通利小便
- C.升清降浊，化气行水
- D. 清利湿热，通利小便

A 型题 67 /165

(65～67 题为共用题干) 患者男、67 岁。有前列腺肥大史 3 年。近两周出现小便不畅、尿如细线，小腹胀满疼痛，舌紫暗，脉涩。
治疗应首选的方剂是

- A.八正散
- B.春泽汤
- C.沉香散
- D.代抵当丸

IA 型题 68 /165

(68～70 题为共用题干) 患者女性、49 岁。支气管哮喘病史 5 年。一周前因外出受凉而发病，未经治疗，因病情加重而入院。刻下症见：喉中痰鸣如吼，胸高气粗，痰色黄，伴口渴、便秘、舌红、苔黄腻，脉滑数。针灸治疗除定喘外”还应选取的于回是

- A.肺俞、膏肓、太渊、太溪
- B.列缺、尺泽、肺俞、中府
- C.风门、合谷、阴谷、关元
- D. 肺俞、中府、太渊、三阴交

A 型题 69 /165

(68～70 题为共用题干) 患者女性、49 岁。支气管哮喘病史 5 年。一周前因外出受凉而发病，未经治疗。因病情加重而入院。刻下症见：喉中痰鸣如吼，胸高气粗、痰色黄、伴口渴，便秘，舌红、苔黄腻，脉滑数。应选取的配穴是

- A.行间、鱼际
- B.风门、合谷
- C.丰隆、曲池
- D.气海、膻中

IA 型题 70 /165

(68～70 题为共用题干) 患者女性、49 岁。支气管哮喘病史 5 年。一周前因外出受凉而发病，未经治疗，因病情加重而入院。刻下症见：喉中痰鸣如吼，胸高气粗，痰色黄，伴口渴，便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数。定喘穴施术宜采用的方法是

- A.三棱针刺络法

- B.毫针补法
- C.灸法
- D.刺络拔罐法

IA 型题 71 /165

(71～73 题为共用题干) 患者，女性、18 岁。自诉月经紊乱 1 年，1 年来经血非时而下，淋漓不净，血色紫黑，夹有血块，小腹疼痛拒按，下血后疼痛减轻，舌质紫暗有瘀斑，脉涩。
针灸治疗宜主选

- A.任脉、足阳明经穴
- B.任脉、足太阴经穴
- C.足太阴、足厥阴经穴
- D.任脉、督脉

IA 型题 72 /165

(71～73 题为共用题干) 患者，女性，18 岁。自诉月经紊乱 1 年，1 年来经血非时而下，淋漓不净，血色紫黑，夹有血块，小腹疼痛拒按，下血后疼痛减轻。舌质紫暗有瘀斑，脉涩。
针灸治疗宜选取的主穴是

- A.关元、三阴交、隐白
- B.地机、三阴交、足三里
- C.肾俞、太溪、命门
- D.肝俞、归来、公孙

A 型题 73 /165

(71～73 题为共用题干) 患者，女性、18 岁。自诉月经紊乱 1 年，1 年来经血非时而下，淋漓不净，血色紫黑，夹有血块，小腹疼痛拒按，下血后疼痛减轻，舌质紫暗有瘀斑，脉涩。
除主穴外，还应选用的配穴是

- A.血海、行间
- B.血海、太冲
- C.中极、阴陵泉
- D.肾俞、太溪

IA 型题 74 /165

孙思邈指出：“有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍媸，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想”，要求医者应

- A.一视同仁
- B.精研医术
- C.尊重同道
- D.廉洁正直

A 型题 75 /165

医师在执业活动中应当履行的义务是

- A.依法参与所在机构的民主管理
- B.参加专业培训，接受继续医学教育
- C.宣传卫生保健知识，对患者进行健康教育

D.参加专业学术团体

A 型题 76 /165

关于医患沟通，说法错误的是

- A.医患沟通将耗费正常的诊疗时间，所以应该尽量避免与病人沟通，直切主题
- B.它对增进医患关系的和谐、改进医疗服务有促进作用
- C.良好的医患沟通有利于减少医疗纠纷
- D.它是医患双方围绕诊疗、服务、健康及心理等相关因素的信息沟通

A 型题 77 /165

患者女性，27岁，因出现类似早孕症状两次到某县医院门诊就医，大夫简单检查后均诊断为妇科炎症，但该女士服药多日症状未见缓解。半个月后，因突然阴道大出血和急腹症被送往医院抢救后确诊为宫外孕。该案例中初诊医生可能违背的临床诊疗伦理要求是

- A.关心体贴，减少痛苦
- B.全面系统，认真细致
- C.耐心倾听，正确引导
- D.尊重病人，心正无私

A 型题 78 /165

一名病人因突发心脏病被送医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续、当病人家属拿来钱时。已错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案例违背了病人享有的

- A.自主权
- B.知情同意权
- C.保护隐私权
- D.基本的医疗权

A 型题 79 /165

一些做临床科研工作的医生未征求病人的同意，只与病人的主管大夫打声招呼，便以某种理由顺便多取一些血液或骨髓穿刺液等。从医学伦理学的角度分析，下列说法正确的为

- A.若告知，患者会产生不必要的心理负担，不利于原来疾病的治疗，所以不告知在道德上是可以得到辩护的
- B.若告知，病人多数不会同意，科研没有保障，所以，不告知在道德上是可以得到辩护的
- C.无论科研的动机好坏，只要未经过患者的知情同意、任何人体实验在道德上都不能得到辩护的
- D.临床科研的动机是善良的，即便未经过知情同意，在道德上也是无可指责的

A 型题 80 /165

根据《中华人民共和国刑法》的规定，以下行为将被处以三年以上十年以下有期徒刑的是

- A.未取得医生执业资格的人擅自为他人进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器，严重损害就诊人身体健康的
- B.非法运送、邮寄、携带我国人类遗传资源材料出境，危害公众健康或者社会公共利益，情节特别严重的
- C.非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品，不符合国家规定的标准，对人体健康造成严重危害的

D.从事实验、保藏、携带、运输传染病菌种、毒种的人员。违反国务院卫生行政部门的有关规定，造成传染病菌种、毒种扩散，后果严重的

A 型题 81/165

患者、陈某因手术效果不佳与医院发生争议，要求复制病历资料。医院按照规定复制了病历资料，并告知陈某另有部分病历资料不予复制，只能在医患双方在场的情况下封存。这部分病历资料是

- A.病程记录
- B.医学影像检查资料
- C.医嘱单
- D.手术及麻醉记录单

B 型题 82 /165

六淫邪气中，易使毛窍腠理闭塞而导致无汗的是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪

B 型题 83 /165

六淫邪气中，易使毛窍腠理不固而导致汗出的是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪

1B 型题 84 /165

根据《素问·宣明五气》说“久卧”

- A.伤肉
- B.伤气
- C.伤骨
- D.伤筋

B 型题 85 /165

根据《素问·宣明五气》说“久行”

- A.伤肉
- B.伤气
- C.伤骨
- D.伤筋

B 型题 86 /165

肾阴不足，虚火上炎可见

- A.口淡
- B.口酸

- C.口咸
- D.口甜

B 型题 87 /165

肝胃郁热，可见

- A.口淡
- B.口酸
- C.口咸
- D.口甜

B 型题 88 /165

属于热证转寒临床表现的是

- A.寒湿痹病，过服温燥药物而致患处红肿灼痛
- B.自觉发热，欲脱衣揭被，触之胸腹无灼热、下肢厥冷
- C.咳嗽吐痰、息粗而喘、苔腻脉滑，久之气短而喘、声低懒言
- D.疫毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白

B 型题 89 /165

属于实证转虚临床表现的是

- A.寒湿痹病，过服温燥药物而致患处红肿灼痛
- B.自觉发热，欲脱衣揭被，触之胸腹无灼热、下肢厥冷
- C.咳嗽吐痰、息粗而喘、苔腻脉滑，久之气短而喘、声低懒言
- D.疫毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白

B 型题 90 /165

血竭、五灵脂的功效共同点是

- A.活血祛瘀，通经止痛
- B.活血止痛，化瘀止血
- C.活血定痛，消肿生肌
- D.破血行气，消积止痛

B 型题 91/165

乳香、没药的功效共同点是

- A.活血祛瘀，通经止痛
- B.活血止痛，化瘀止血
- C.活血定痛，消肿生肌
- D.破血行气，消积止痛

B 型题 92 /165

既治感冒头痛、风疹瘙痒，又治疮疡初起的药物是

- A.辛夷
- B.荆芥
- C.羌活
- D.防风

B 型题 93 /165

既治感冒头痛、风疹瘙痒，又治风湿痹痛的药物是

- A.辛夷
- B.荆芥
- C.羌活
- D.防风

B 型题 94 /165

当归四逆汤中细辛的配伍意义是

- A.温肺化饮
- B.祛风散邪
- C.温经散寒
- D.散寒止痛

B 型题 95 /165

小青龙汤中细辛的配伍意义是

- A.温肺化饮
- B.祛风散邪
- C.温经散寒
- D.散寒止痛

IB 型题 96 /165

治疗胃虚有热之呃逆，应首选的方剂是

- A.旋覆代赭汤
- B.苏子降气汤
- C.橘核丸
- D.橘皮竹茹汤

B 型题 97 /165

治疗胃虚痰阻之呃逆，应首选的方剂是

- A.旋覆代赭汤
- B.苏子降气汤
- C.橘核丸
- D.橘皮竹茹汤

B 型题 98 /165

患者大便干结，欲便不得出，肠鸣矢气，胸胁满闷，舌苔薄腻，脉弦。其诊断是

- A.气秘
- B.冷秘
- C.气虚秘
- D.阳虚秘

IB 型题 99 /165

患者大便干结，腹痛拘急，胀满拒按，手足不温，舌苔白腻，脉弦紧。其诊断是

- A.气秘
- B.冷秘
- C.气虚秘
- D.阳虚秘

B 型题 100 /165

患者两耳蝉鸣，时轻时重，胸中烦闷，痰多，口苦，喜太息，舌苔薄黄而腻，脉象弦滑。其诊断是

- A.耳鸣耳聋之肝胆火盛证
- B.耳鸣耳聋之肾精亏虚证
- C.耳鸣耳聋之痰火郁结证
- D.耳鸣耳聋之清气不升证

B 型题 101 /165

患者耳鸣耳聋，时轻时重，劳则加其，肢倦神疲、大便溏薄，舌苔薄白而腻，脉象细弱。其诊断是

- A.耳鸣耳聋之肝胆火盛证
- B.耳鸣耳聋之肾精亏虚证
- C.耳鸣耳聋之痰火郁结证
- D.耳鸣耳聋之清气不升证

B 型题 102 /165

外踝尖上 3 寸，腓骨前缘的是

- A.悬钟
- B.光明
- C.复溜
- D.三阴交

B 型题 103 /165

内踝尖上 3 寸，胫骨内侧面后缘的是

- A.悬钟
- B.光明
- C.复溜
- D.三阴交

B 型题 104 /165

同时取风府、哑门、大椎穴时，宜选择的体位是

- A.侧卧位
- B.仰卧位
- C.俯伏坐位
- D.仰靠坐位

B 型题 105/165

同时取一侧风市、日月、飞扬、足临泣穴时，宜选择的体位是

- A.侧卧位
- B.仰卧位
- C.俯伏坐位
- D.仰靠坐位

X 型题 106/165

下列选项中，按五行相生次序排列的是

- A.宫、商、角、徵、羽
- B.呼、笑、歌、哭、呻
- C.握、咳、哕、忧、栗
- D.生、长、化、收、藏

X 型题 107 /165

下列属于“相乘”的有

- A.水气凌心
- B.水不涵木
- C.木火刑金
- D.肝气犯脾

X 型题 108/165

下列属于六腑生理特点的是

- A.泻而不藏
- B.实而不能满
- C.藏而不泻
- D.满而不能实

X 型题 109 /165

下列不属于肺气肃降运动表现的是

- A.吸入自然界的清气
- B.呼出体内的浊气
- C.布散津液于体表
- D.输送代谢后产生的浊液于肾或膀胱

X 型题 110 /165

下列属于宗气来源的是

- A.水谷精气
- B.肾中精气
- C.先天之精气
- D.自然界清气

X 型题 111/165

下列各组经脉，其循行均入“缺盆”的是

- A.足阳明胃经与手阳明大肠经

- B.手太阳小肠经与足太阳膀胱经
- C.手少阳三焦经与足少阳胆经
- D.足少阴肾经与手少阴心经

X 型题 112 /165

精的失常可导致的病理变化有

- A.精虚
- B.失精
- C.精瘀
- D.精脱

X 型题 113 /165

下列有关“内湿”的表述，正确的是

- A.关键在于脾的运化失职
- B.肾阳虚衰亦可导致湿浊内生
- C.临床可表现为头重如裹，肢体重浊、胸闷咳嗽、水肿等
- D.可阻滞于机体上、中、下三焦任何部位，但以湿阳中焦为多

X 型题 114 /165

可引起脉道不利的原因有

- A.嗜食咸味
- B.津液枯涸
- C.痰浊内阻
- D.寒凝瘀阻

X 型题 115 /165

下列叙述中，符合因人制宜的是

- A.偏阳盛或阴虚之体，慎用寒凉之品
- B.妊娠期禁用滑利走窜药物
- C.小儿用药药量宜轻，忌用峻剂
- D.老年人用药官多用补虚之品

X 型题 116 /165

下列选项中，不属于问诊中个人生活史内容的是

- A.生活经历
- B.平素健康状况
- C.亲属的健康状况
- D.药物过敏史

X 型题 117 /165

睡时露睛可见于

- A.正常人
- B.痰热内闭
- C.脾胃虚弱

- D.吐泻伤津

X 型题 118 /165

但卧不能坐，坐则眩晕，不耐久坐的病机为

- A.痰饮停肺
- B. 气血俱虚
- C.水气凌心
- D.肝阳化风

X 型题 119 /165

灰黑苔的临床意义是

- A.外感表证
- B.瘀血内阻
- C.阴寒内盛
- D.里热炽盛

X 型题 120 /165

痰食内停证可见的脉象有

- A.涩脉
- B.结脉
- C.动脉
- D.促脉

X 型题 121 /165

下列各项中，属于风淫证候的临床表现的是

- A.皮肤瘙痒
- B.口眼喎斜
- C.恶风汗出
- D.眩晕欲仆

X 型题 122 /165

下列各项中，不属于虚证临床表现的是

- A.脘腹胀满时减
- B.疼痛拒按
- C.恶寒，添衣近火得温不减
- D.舌质嫩

X 型题 123 /165

下列属于肝胃不和证临床表现的是

- A.情绪抑郁
- B.胁肋胀痛
- C.吞酸嘈杂
- D.便溏不爽

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328

X 型题 124 /165

肺热炽盛证与痰热壅肺证均可见的临床表现是

- A.胸痛
- B.咳嗽气喘
- C.发热口渴
- D.咳痰黄稠量多

X 型题 125 /165

下列可见于湿热蕴脾而不见于寒湿蕴脾的是

- A.纳呆便溏
- B.身目发黄
- C.身热不扬
- D.口苦口黏

X 型题 126 /165

下列药物中，不宜与附子同用的药物有

- A.半夏
- B.白及
- C.白蔹
- D.天花粉

X 型题 127/165

五味子、五倍子均可用于治疗病症是

- A.自汗盗汗
- B.便血痔血
- C.久泻不止
- D.肺虚久咳

X 型题 128/165

下列药物入煎剂，宜包煎的是

- A.辛夷
- B.旋覆花
- C.车前子
- D.珍珠母

X 型题 129 /165

下列属于桔梗主治病证的是

- A.咳嗽痰多
- B.咽痛暗哑
- C.癃闭，便秘
- D.肺痈吐脓

X 型题 130 /165

下列可用篇蓄而不用瞿麦治疗的病是

- A.虫积腹痛
- B.瘀阻经闭
- C.热淋涩痛
- D.皮肤湿疹

X 型题 131/165

有降血压的作用，可用于治疗高血压病的药物是

- A.海风藤
- B.防己
- C.豨莶草
- D.臭梧桐

X 型题 132 /165

对皮肤、黏膜有很强的刺激作用，能引起皮肤发红、灼热、起泡的药物是

- A.斑蝥
- B.白芥子
- C.三棱
- D.半夏

X 型题 133 /165

首乌藤可用于治疗

- A.皮肤瘙痒
- B.失眠多梦
- C.跌扑伤痛
- D.血虚身痛

X 型题 134/165

性味甘平、归脾、肺、肾经的药物是

- A.玉竹
- B.黄精
- C.山药
- D.石斛

X 型题 135 /165

白矾的功效有

- A.燥湿止痒
- B.止血止泻
- C.祛除风痰
- D.解毒杀虫

X 型题 136 /165

下列关于“十剂”的内容正确的是

- A.宣可去滞

- B.通可去壅
- C.轻可去实
- D.重可去怯

X 型题 137 /165

组成中含有龙骨、牡蛎的方剂是

- A.固冲汤
- B.固经丸
- C.镇肝熄风汤
- D.金锁固精丸

X 型题 138

具有宽胸散结作用的方剂是

- A.枳实消痞丸
- B.四磨汤
- C.小陷胸汤
- D.失笑散

X 型题 139 /165

下列选项中，属于《伤寒论》四逆散原方加减的是

- A.咳者、加五味子、干姜
- B.腹中痛者，加芍药
- C.小便利者，加茯苓
- D.泄利下重者，加薤白

X 型题 140/165

黄芩、黄连、黄柏同用的方剂是

- A.黄连解毒汤
- B.当归六黄汤
- C.普济消毒饮
- D.芍药汤

X 型题 141/165

清燥救肺汤与桑杏汤的组成中均含有的药物是

- A.麦门冬
- B.桑叶
- C.沙参
- D.杏仁

X 型题 142 /165

下列方剂中，配伍五味子有敛肺止咳之义的是

- A.四神丸
- B.小青龙汤
- C.生脉散

- D.九仙散

X 型题 143 /165

下列方剂中，遣药配伍体现“治风生治血”的是

- A.独活寄生汤
- B.大秦芩汤
- C.川芎茶调散
- D.消风散

X 型题 144 /165

可用于治疗霍乱吐泻的方剂有

- A.连朴饮
- B.藿香正气散
- C.五苓散
- D.理中丸

X 型题 145 /165

下列属于肾气丸主治症临床表现的是

- A.腰痛脚软
- B.小便反多
- C.水肿，消渴
- D.脚气、转胞

X 型题 146 /165

下列各项中，不属于心悸心阳不振证临床表现的是

- A.心悸眩晕，下肢浮肿
- B.心悸不安，形寒肢冷
- C.心悸气短，头晕目眩
- D.心悸善惊，坐卧不安

X 型题 147 /165

下列各项中，属于哮喘缓解期常见证型的是

- A.虚哮证
- B.肺虚证
- C.脾虚证
- D.肾虚证

X 型题 148 /165

胸痹的病机有虚实两方面，其“实”有

- A.血瘀
- B.气滞
- C.寒凝
- D.痰浊

×型题 149 /165

治疗鼓胀实证的常用治法有

- A.温中健脾，行气利水
- B.清热利湿，攻下逐水
- C.疏肝理气，运脾利湿
- D.活血化瘀，行气利水

X 型题 150 /165

呕吐与反胃均有的临床特征是

- A.同属胃的病变
- B.都有呕吐的临床表现
- C.均系脾胃虚寒所致
- D.病机都是胃失和降，气逆于上

X 型题 151/165

以半夏白术天麻汤为主方治疗的病证有

- A.痰浊头痛
- B.痴呆之痰浊蒙窍证
- C.痰厥
- D.眩晕之痰湿中阻证

X 型题 152 /165

下列选项中，适用于膏淋辨证治疗的是

- A.沉香散
- B.膏淋汤
- C.无比山药丸
- D.程氏萆薢分清饮

X 型题 153 /165

下列各项，属于《血证论》提出的治血四法的是

- A.行血
- B.补肝
- C.宁血
- D.止血

X 型题 154 /165

下列各项中，属于痢疾辨证要点的有

- A.辨久暴，察虚实主次
- B.辨寒热偏重
- C.辨伤气、伤血
- D.辨邪正盛衰

X 型题 155/165

关于虚劳之气虚的辨证选方，正确的是

- A.肺气虚证用补肺汤
- B.脾气虚证用加味四君子汤
- C.肾气虚证用大补元煎
- D.心气虚证用养心汤

X 型题 156/165

不属于内伤发热特点的是

- A.发病缓慢，病程较长
- B.发热伴恶寒，恶寒得衣被不减
- C.热势（体温较高）较高
- D.一般有气、血、阴、阳亏虚

X 型题 157 /165

引起颤证的病因有

- A.年老体虚
- B.外邪侵袭
- C.情志过极
- D.饮食不节

X 型题 158/165

属于足阳明胃经，位于瞳孔直下的腧穴是

- A.承泣
- B.地仓
- C.四白
- D.阳白

X 型题 159 /165

下列腧穴定位的描述，正确的是

- A.肩井位于在三角肌区，肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中
- B.下关位于面部、颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中
- C.大陵位于腕前区、腕掌侧远端横纹尺侧端、尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- D.阴谷位于膝后区，腘横纹上，半腱肌肌腱外侧缘

X 型题 160 /165

下列特定穴中，既属于下合穴，又属于合穴的是

- A.上巨虚
- B.足三里
- C.阴陵泉
- D.委中

X 型题 161/165

具有保健作用的腧穴是

- A.足三里
- B.关元
- C.气海
- D.神阙

X 型题 162 /165

下列单式操作中，属于毫针泻法的是

- A.进针时针尖迎着经脉循行来的方向刺入
- B.针下得气后，先深后浅，轻插重提
- C.呼气时进针，吸气时出针
- D.出针时摇大针孔而不按

X 型题 163 /165

下列各组输穴中，均属于手厥阴心包经的有

- A.天池、曲泽
- B.阴郄、通里
- C.间使、内关
- D.关冲、中渚

X 型题 164 /165

下列腧穴中，宜用毫针横刺的腧穴是

- A.头维
- B.耳门
- C.大杼
- D.阳白

X 型题 165/165

选用翳风、外关、合谷、颊车治疗牙腮，蕴含的配穴方法有

- A.本经配穴法
- B.表里经配穴法
- C.同名经配穴法
- D.远近配穴法

CACAB DCDA DDBCC BABDB1-20
CBACD AAADC BDBBC ABDCA21-40
DACBD CDDAD ABAAB BABBC41-60
DBADB ADBCD BABAC ABDCA61-80
ABABD CBDCB CBDCA DAABC81-100
DADCA
BD AD AB BC AD
AC ABCD ABCD ABCD BCD BCD ACD BD CD AD111-120
ABC BC ABC ABC CD ABCD ACD ABC ABCD AD121-130
BCD AB ABD BC ABCD CD ACD BC ACD AB131-140
BD BCD ABD ABCD ABCD ACD BCD ABCD ABCD ABD141-150
AD BD CD ABCD ABC BC ACD ABC BD BD 151-160
ABCD ABD AC AD ACD

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328